

التهاب الفم: الوقاية منه وعلاجه

التهاب الفم:

يتصف بالتهاب أغشية الطبقة الداخلية في الفم. وهي حالة مؤلمة تؤثر غالباً بالسلب على حياتك اليومية، بما في ذلك قدرتك على تناول الطعام والشراب وحتى الكلام.



معلومات تهم المريض

- يجب أن تعلم أهمية معرفة المعلومات عن التهاب الفم والتدخل المبكر.
- يُحتمل إصابتك بقرح بالفم والتهاب الأغشية المخاطية بالفم.
- يجب أن تهتم بالنظافة الصحية الجيدة للفم.



الوقاية منه



- ◀ اغسل فمك جيداً باستخدام بيكربونات الصودا و محلول ملحي أو منتج مماثل بانتظام.
- ◀ أغسل الأسنان ونظفها بخيط الأسنان بعد كل وجبة.
- ◀ استخدم معجون أسنان لطيف (على سبيل المثال: معجون أسنان للأطفال) وفرشاة أسنان لينة.
- ◀ تجنب المواد المحتوية على الكحول وبيروكسيد الهيدروجين واليود ومشتقات الزعتر.
- احرص على القيام بفحوصات منتظمة لأسنانك.
- قم سريعاً بالإبلاغ عن أية أعراض أو علامات.
- ◀ تميل الأعراض إلى الحدوث مبكراً؛ لذا يجب الإبلاغ عنها سريعاً بعد ظهورها لبدء التدخل المبكر.
- ◀ اتصل بطبيب علاج الأورام أو بمدمن الرعاية الخاص بك عند ظهور أولى علامات الشعور بضيق في الفم و/أو إصابات تتدافع مع تناول الطعام والشراب.
- يجب الحذر عند تناول أية أطعمة حارة حامضة مالحة.

دليل علاج التهاب الفم



العلاج	الأعراض	الدرجة
<ul style="list-style-type: none"> العلاج باستخدام محلول ملحي (٩٪) أو غسول لفم لا يحتوى على الكحول مثل «Listerine» واغسل فمك عدة مرات في اليوم. 	 <p>وجود التهابات مع عدم الشكوى (نظام غذائي عادي).</p>	١
<ul style="list-style-type: none"> العلاج باستخدام مسكنات فم موضعية (على سبيل المثال: بنزوكاين، بوتيل أمينوبنتروات، هيدروكلوريد التتراكايين، منثول أو فينول benzocaine, butyl, aminobenzoate," tetracaine hydrochloride, menthol, or "phenol مع أو بدون كورتيكosteroides موضعية (أي دهان تريامسينيولون للفم «triamcinolone oral paste»). تجنب الأدوية المحتوية على الكحول وبieroکسید الهيدروجين واليود ومشتقات الزعتر. 	 <p>تظهر أعراض (لكن يمكنك التناول والبلع باتباع نظام غذائي معدل).</p>	٢
	 <p>تظهر أعراض (مع عدم قدرتك على تناول الطعام أو الشراب بالفم بشكل كاف).</p>	٣
	 <p>أعراض شديدة (تأثير على حياتك).</p>	٤